

# Kritikus állapotú COVID betegek endotracheális intubációja

(DAS ajánlás alapján)

+1 extra próbálkozás szakértő segítő által engedélyezett az „A”, „B/C”, „C” tervek is

**ELŐKÉSZÜLETEK**  
PPE szakember felvétele  
MOVE (monitorozás, O2, vénabiztosítás, előbbiek ellenőrzése)  
Beteg pozicionálása: ramping  
Légutak felmérése (MACOCHA, ligamentum conicum)  
Gyomorteltség ellenőrzése / szsz. detenzionálás  
Hemodinamikai optimalizáció  
Eszközök és gyógyszerek összekészítése  
Légúti terv egyeztetése a csapattal, csekklista

## PREOXIGENIZÁCIÓ

SpO2 / ETCO2 / ETO2 ellenőrzése

## „A” terv: videolaringoszkópia és intubálás

(max. 3 próbálkozás)  
Oxigenizáció fenntartása (APOX, REOX)  
Adekvát analgosedáció és izomrelaxáció  
Bougie használata  
Légúti leszívás szsz.  
BURP / Sellick szsz. használata

Siker

Tubuspozíció ellenőrzése kapnográfával

Első sikertelenség

FONA szett ellenőrzése

## Deklaráljuk: „SIKERTELEN INTUBÁCIÓ”

## „B/C” terv: mentő oxigenizáció

(max. 3-3 próbálkozás, váltva)  
Ad 1.: 2. generációs SGA (iGel)  
Ad 2.: FMV (OPT/NPT, kétkezes V-E fogás, 2 ember)

Siker

**Újratervezés**  
Ad 1.: ETI SGA-n keresztül  
Ad 2.: FONA

Első sikertelenség

FONA szett kinyitása

## Deklaráljuk: „CICO”

## „D” terv: FONA kivitelezése (konikotomia)

Pozicionálás (nyak extendálása)  
Oxigenizáció lehetőség szerinti fenntartása (FMV)  
Izomrelaxáció fenntartása  
Ligamentum conicum azonosítása  
Metódus: „szike-bougie-tubus”

Siker

**Post-FONA teendők**  
Esetleges szövődmények felkutatása és ellátása